



[Retour](#)

Le coût des maladies du travail pour lesquelles le stress au travail intervient.

- En 2008, en France, **les maladies cardiovasculaires** représentaient la 2^{ème} cause de décès pour les hommes âgés de 45 à 64 ans. Fin 2008, elles constituaient la première cause de prise en charge en affection de longue durée.

Cette grande catégorie de diagnostic était au premier rang des dépenses.



[Retour](#)

Le coût des maladies du travail pour lesquelles le stress au travail intervient.

- **Les problèmes de santé mentale**, dont l'anxiété et la dépression constituent l'essentiel des troubles pour les populations au travail. En France, le suicide, qui est fortement lié à la dépression, représentait en 2008, la 1^{ère} cause de mortalité pour les hommes et les femmes âgés de 25 à 44 ans, la 5^{ème} pour les hommes de 45 à 64 ans et la 3^{ème} pour les femmes du même âge. La consommation de psychotropes est particulièrement élevée en France en comparaison à d'autres pays occidentaux. Ces troubles sont également associés à une fréquence accrue de l'absentéisme au travail pour raison de santé.

Cette grande catégorie de diagnostic était au second rang des dépenses.



[Retour](#)

Le coût des maladies du travail pour lesquelles le stress au travail intervient.

- **Les troubles musculo-squelettiques** constituent la 1^{ère} maladie professionnelle reconnue loin devant toutes les autres maladies professionnelles. Leur coût représentait plus du tiers des indemnisations du régime général au titre des maladies professionnelles en 2008. Ils sont aussi une des principales raisons d'absence pour raison de santé et d'invalidité.

Cette grande catégorie de diagnostic était au troisième rang des dépenses.